



Vous prenez un somnifère ou un calmant Vous pourriez être à risque

Alprazolam (Xanax®)

Bromazepam (Lexomil®)

Clobazam (Urbanyl®)

Clonazepam (Rivotril®)

Clorazepate (Tranxène®)

Clotiazepam (Veratran®)

Diazepam (Valium®)

Estazolam (Nuctalon®)

Flunitrazepam (Rohypnol®)

Loflazepate d'éthyle (Victan®)

Lorazepam (Temesta®)

Loprazepam (Havlane®)

Lormetazepam

(Noctamide®)

Nitrazepam (Mogadon®)

Nordazepam (Nordaz®)

Oxazepam (Seresta®)

Prazepam

(Lysanxia®)

Zolpidem (Stilnox®)

Zopiclone (Imovane®)

 UCLouvain

 LUSS
LIQUE DES USAGERS
DES SERVICES DE SANTÉ

 Société Belge
de GERONTOLOGIE
et de GERIATRIE

 SSPF

 SSMG
Société Royale

Cette brochure est directement inspirée de la brochure « Vous êtes à risque » (© 2014 par Cara Tannenbaum et l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal) telle qu'adaptée par l'Université catholique de Louvain. Tous droits de reproduction et d'adaptation réservés.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES AU SUJET DE VOTRE MEDICAMENT



QUIZ

Somnifères et calmants

1. Ce médicament est la meilleure solution pour gérer mon insomnie et/ou mon anxiété.

VRAI FAUX
2. Ce médicament peut être pris en toute sécurité pour une longue durée.

VRAI FAUX
3. Ce médicament ne me cause aucun effet indésirable.

VRAI FAUX
4. Je ne pourrais pas dormir ou je me sentirais trop anxieux sans ce médicament.

VRAI FAUX



RÉPONSES



1. FAUX

Les experts ne recommandent plus de prendre un somnifère ou un calmant pour gérer l'insomnie ou l'anxiété. Les personnes qui prennent ce médicament sont :

- 5 fois plus à risque d'avoir des problèmes de mémoire et de concentration
- 4 fois plus à risque de se sentir fatigué pendant la journée
- 2 fois plus à risque de faire une chute et d'avoir une fracture (hanche, poignet)
- 2 fois plus à risque d'avoir un accident de voiture
- Plus à risque de développer des problèmes de pertes urinaires

2. FAUX

Même si les somnifères et calmants sont efficaces à court terme, des études ont démontré qu'ils ne sont plus le meilleur traitement à long terme pour l'anxiété et les troubles du sommeil.

Ces médicaments ne font que masquer les symptômes sans régler le problème, tout en provoquant de nombreux effets indésirables. Poursuivez votre lecture pour en apprendre plus sur les stratégies pour améliorer vos habitudes de sommeil et réduire votre stress.

3. FAUX

Même si vous ne prenez qu'une petite dose, un somnifère ou un calmant peut causer des effets indésirables. Il peut nuire au fonctionnement de votre cerveau et ralentir vos réflexes.

4. VRAI... temporairement

Votre corps a sans doute développé une dépendance physique et psychologique à ce médicament. Si vous cessez de le prendre d'un seul coup, vous pourriez éprouver plus d'anxiété et des troubles du sommeil. Cependant, même si cela peut ne pas être facile, des millions de personnes ont réussi à progressivement cesser ce médicament et ont trouvé d'autres solutions.

Le saviez-vous ?



Avec l'âge, ce médicament persiste plus longtemps dans le corps. Il peut causer de multiples effets indésirables.



Par exemple, votre somnifère ou calmant peut vous causer de la fatigue, de la somnolence, de la faiblesse et même causer des pertes d'équilibre ou des chutes. Cela peut être la cause de fractures de la hanche, de problèmes de mémoire ou de fuites urinaires. Il peut vous causer de la somnolence en journée. Vous pourriez vous endormir en conduisant votre voiture.



De plus, votre somnifère ou calmant peut engendrer une forte dépendance. Cela veut dire qu'il est normal de ne pas pouvoir vous en passer du jour au lendemain.



En effet, l'arrêt soudain des somnifères et calmants peut entraîner des effets de sevrage désagréables. Pour éviter cela, la dose doit être réduite progressivement. Un exemple de programme de sevrage en plusieurs semaines est fourni à la page 11.



Dans la plupart des cas, il existe des moyens plus sûrs qui pourraient soulager votre anxiété ou votre insomnie. Même si vous ne ressentez pas d'effets indésirables, planifiez une discussion avec votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmier. Ils vous aideront à déterminer une solution avec moins d'effets indésirables vous permettant de préserver votre qualité de vie.

Consultez votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmier avant de cesser tout médicament

Posez-vous ces questions:

Prenez-vous un somnifère ou un calmant depuis longtemps ?

OUI NON

Vous sentez-vous fatigué ou somnolent pendant la journée ?

OUI NON

Vous réveillez-vous le matin avec la sensation d'être encore très fatigué, pas reposé ?

OUI NON

Vous arrive-t-il d'avoir des problèmes de mémoire ou d'équilibre ?

OUI NON

Vous arrive-t-il de trouver votre médicament moins efficace qu'avant ?

OUI NON

Avec l'âge

Comme toute personne de 65 ans et plus, différents changements se produisent dans votre corps avec les années :

- La façon dont votre corps réagit aux médicaments change.
- Les reins et le foie fonctionnent moins bien.

C'est pourquoi les médicaments peuvent rester plus longtemps dans le corps, ce qui peut augmenter les effets indésirables.

De plus, vos problèmes de santé et la prise d'autres médicaments peuvent aussi modifier les effets de votre somnifère ou calmant.

Malheureusement, on parle peu de ces effets indésirables lorsqu'on vous prescrit des somnifères ou des calmants. Nous vous recommandons d'en discuter avec votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmier. D'autres solutions pourraient soulager votre anxiété ou améliorer votre sommeil avec moins d'effets indésirables et une meilleure qualité de vie.

D'autres moyens pour vous aider à dormir

- Se lever à la même heure chaque matin et se coucher à la même heure tous les soirs.
- Pratiquer des exercices de méditation ou de relaxation avant d'aller au lit.
- Rester actif pendant la journée (mais ne pas faire de l'activité physique au cours des trois heures avant le coucher).
- Privilégiez la chambre pour le repos uniquement.
- Éviter de consommer des stimulants avant de dormir. La nicotine, l'alcool, la caféine, le coca, le thé sont des stimulants.

>Plus d'informations et de conseils sont également disponibles dans la brochure « Comment obtenir une bonne nuit de sommeil sans médicament » disponible sur le site

www.reseaudescription.ca/ressources

Vous y trouverez notamment des informations sur les changements dans le sommeil qui surviennent avec l'âge, des techniques de respiration et de relaxation, un journal du sommeil ainsi que des conseils supplémentaires pour améliorer votre sommeil.

>Utiliser un journal du sommeil pour vous aider à comprendre ce qui perturbe votre sommeil. Votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier peut vous en donner un.

>Si toutes ces solutions ne sont pas suffisantes, votre pharmacien ou votre médecin peut vous aider à trouver des solutions plus personnalisées. Parlez-en avec eux.

D'autres moyens de gérer le stress et l'anxiété

- Pratiquer des techniques de relaxation comme les étirements, du yoga, un massage, de la méditation, de la musicothérapie ou du tai chi. Ces techniques peuvent vous aider à soulager le stress quotidien et à surmonter votre anxiété. Il existe des activités adaptées à tout âge et toute condition physique. Renseignez-vous auprès de votre professionnel de la santé, votre commune ou votre mutuelle
- En parler à un thérapeute (psychologue, médecin). Il est prouvé que cela aide les gens à gérer les situations stressantes et ce qui les rend anxieux. Des médecins spécialisés dans les troubles anxieux peuvent également vous aider.
- Demander à votre médecin ou votre pharmacien si d'autres médicaments avec moins d'effets indésirables sont disponibles pour réduire votre anxiété.





L'histoire de Madame Mertens

Elle prenait du lormétazépam (Noctamide®),
un médicament comme celui que vous prenez

« J'ai 75 ans et je prenais du lormétazépam depuis plus de 10 ans. Il y a quelques mois, je suis tombée en pleine nuit en allant à la toilette. J'ai vraiment eu de la chance – pas de fracture, que des bleus. J'ai lu que le lormétazépam pouvait être la cause de chutes. Je ne savais pas si je pouvais me passer de ce médicament pour dormir, car j'avais encore de la difficulté à m'endormir ou je me réveillais parfois la nuit.

Mon médecin m'a dit qu'à mon âge, six heures de sommeil par nuit était probablement suffisant. J'ai donc décidé de réduire graduellement ma dose de lormétazépam. J'en ai parlé à mon pharmacien qui m'a proposé un programme de sevrage par étapes, comme sur la page suivante.

J'ai aussi adopté de nouvelles habitudes de sommeil. Je ne lis plus au lit et je ne fais plus d'exercices avant de me coucher. Je me lève tous les jours à la même heure, que j'ai eu une bonne nuit de sommeil ou non.

J'ai réussi à cesser de prendre le lormétazépam. Je me rends compte que je n'ai pas vécu pleinement ces 10 dernières années. Cesser le lormétazépam a levé un voile sur une vie que je vivais à moitié endormie. J'ai plus d'énergie et mon humeur est plus stable. Je suis plus alerte. Il m'arrive encore d'avoir de la difficulté à m'endormir, mais au moins je me lève le matin sans me sentir somnolente. Je suis fière de ma décision. Si je l'ai fait, vous le pouvez aussi ! »

PROGRAMME DE SEVRAGE

Voici un **exemple** de programme de sevrage. Il est recommandé de le suivre **avec votre médecin ou votre pharmacien** afin d'arrêter progressivement votre somnifère ou votre calmant.

Certaines personnes ont besoin de moins de temps ou de plus de temps. **Il peut être adapté en fonction de vos besoins.**

Parlez-en avec votre professionnel de la santé.

Si votre médicament ne se coupe pas facilement, votre pharmacien peut vous aider à trouver une alternative.

SEMAINES	EXEMPLE DE PLAN DE SEVRAGE							✓
	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM	
1 et 2								
3 et 4								
5 et 6								
7 et 8								
9 et 10								
11 et 12								
13 et 14								
15 et 16								
17 et 18								

Légende



Pleine dose



La moitié de la dose



Le quart de la dose



Aucune dose

